

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Antibiophilus – Hartkapseln**

Wirkstoff: Lactobacillus casei rhamnosus (LCR 35)

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen..
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind (siehe Abschnitt 4).
- Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, bei Durchfall mit Blutbeimengung oder starker Temperaturerhöhung, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Antibiophilus und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Antibiophilus beachten?
3. Wie ist Antibiophilus einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Antibiophilus aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Antibiophilus und wofür wird es angewendet?**

Die im menschlichen Darm natürlich lebenden Bakterien (Darmflora) sind für das normale Funktionieren der Darmtätigkeit und Verdauung von größter Wichtigkeit. Diese Darmflora besteht aus verschiedenen Arten von Bakterien, die miteinander in einem ausgewogenen Gleichgewicht leben. Durch ungewohnte oder falsche Ernährung, Infektionen, Behandlung mit Antibiotika oder Strahlenbehandlung kann es zu einer Störung dieses Gleichgewichts und in der Folge zu Durchfällen kommen.

Eine sehr wichtige Art dieser im menschlichen Darm natürlich vorkommenden Keime sind Milchsäurebakterien (Laktobazillen). Antibiophilus enthält eine große Zahl lebensfähiger Milchsäurebakterien. Durch die Einnahme von Antibiophilus kann so eine geschädigte oder zerstörte Darmflora wieder in ihr natürliches Gleichgewicht gebracht werden.

#### **Anwendungsgebiete**

Behandlung von Durchfällen verschiedener Ursachen, vor allem auch von Durchfällen nach Behandlung mit Antibiotika oder nach Strahlenbehandlung.

Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, bei Durchfall mit Blutbeimengung oder starker Temperaturerhöhung, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Antibiophilus beachten?**

**Antibiophilus darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Lactobacillus casei rhamnosus oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Antibiophilus einnehmen.

Da der Körper bei Durchfällen Wasser und Salze verliert, müssen Sie in jedem Fall auf eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit und Mineralstoffen achten. Das Ausmaß muss an die Schwere des Durchfalls, das Alter und die Verhältnisse des Patienten angepasst werden. Bei akutem Durchfall mit hohem Fieber, sowie bei Säuglingen und Kleinkindern darf Antibiohilus nicht ohne ärztliche Untersuchung und Verordnung verwendet werden.

Bei Durchfällen, die länger als 2 Tage andauern bzw. mit Blutbeimengungen oder starker Temperaturerhöhung einhergehen, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Neu- und Frühgeborenen mit folgenden Hochrisikoerkrankungen wird von der Anwendung von Antibiohilus abgeraten:

- Minderversorgung lebenswichtiger Organe mit Sauerstoff (perinatale Asphyxie)
- angeborener Herzfehler
- schwere angeborene Entwicklungsstörungen des Magen-/Darmtraktes
- entzündliche Darmerkrankung (nekrotisierende Enterokolitis)
- extrem geringes Geburtsgewicht von unter 1000 Gramm

Zur Anwendung von Antibiohilus bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa) liegen keine Daten vor.

### **Einnahme von Antibiohilus zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Da die Wirkung durch Antibiotika vermindert werden kann, soll eine Pause von ca. 2 Stunden zwischen den beiden Einnahmen liegen.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Die Milchsäurebakterien (Laktobazillen) in Antibiohilus sind natürliche Darmbewohner, eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ist möglich.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Antibiohilus hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Antibiohilus enthält Lactose**

Eine Kapsel Antibiohilus enthält 0,05 g Lactose-Monohydrat (Milchzucker). Bitte nehmen Sie Antibiohilus erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **3. Wie ist Antibiohilus einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### **Dosierung bei akuten Diarrhoen:**

Erwachsene:

4 - 8 Kapseln täglich, aufgeteilt auf 2 - 4 Einnahmen

Jugendliche, Kinder, Kleinkinder:

2 - 4 Kapseln täglich, aufgeteilt auf 2 Einnahmen

Kleinkinder (unter 2 Jahren): Anwendung in Verbindung mit einer Rehydratations-Therapie. Es wird die Verwendung von Antibiohilus – Pulver zum Einnehmen empfohlen.

Kinder ab 2 Jahren: Die Behandlung ersetzt nicht eine notwendige Rehydratations-Therapie.

#### **Dosierung bei chronischen Diarrhoen:**

Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Kleinkinder:

3 - 6 Kapseln täglich, aufgeteilt auf 3 Einnahmen

**Dosierung bei Säuglingen und Frühgeborenen:**

Bei oraler Gabe wird die Verwendung von Antibiohilus - Pulver zum Einnehmen empfohlen.

Dosierung bei Sondengabe:

Geburtsgewicht von > 2000 g: 2 - 4 Kapseln täglich, aufgeteilt auf zumindest 2 Gaben

Geburtsgewicht von 1000 - 2000 g: 2 Kapseln täglich, aufgeteilt auf zumindest 2 Gaben

Bei schweren Fällen kann die Dosis erhöht werden. Zur Verabreichung höherer Dosen steht auch Antibiohilus - Pulver zum Einnehmen zur Verfügung.

**Dauer der Anwendung:**

Im Allgemeinen ist eine Therapiedauer von ca. 10-14 Tagen ausreichend. Für die wirkungsvolle Besserung der Symptome chronischer Erkrankungen ist eine Anwendung von bis zu 3 Monaten möglich.

**Art der Anwendung**

Zum Einnehmen.

Kapseln mit etwas Flüssigkeit unzerkaut schlucken.

Es wird empfohlen, Antibiohilus zwischen den Mahlzeiten einzunehmen, um die Magenpassage möglichst kurz zu halten.

**Wenn Sie eine größere Menge von Antibiohilus eingenommen haben, als Sie sollten**

Vergiftungen nach Überdosierung sind nicht bekannt und sind auch nach einem mehrfachen der empfohlenen Dosis nicht zu erwarten.

**Wenn Sie die Einnahme von Antibiohilus vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Keine Nebenwirkungen bekannt.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Antibiohilus aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton/Etikett nach „verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Antibiophilus enthält**

- Der Wirkstoff ist: Lactobacillus casei rhamnosus (LCR 35). 1 Kapsel zu 250 mg Pulver enthält lebensfähige Keime von LCR 35 mit einer Keimzahl von mindestens  $2 \cdot 10^8$ .
- Die sonstigen Bestandteile sind: Kartoffelstärke, Lactose-Monohydrat, LCR 35 Nährmedium, Maltodextrin, Natriumthiosulfat, Natriumglutamat, Magnesiumstearat.  
Kapselmaterial: Gelatine, Titandioxid E-171

### **Wie Antibiophilus aussieht und Inhalt der Packung**

Cremefarbene Hartkapseln mit cremefarbenem Pulver zum Einnehmen.

Packungen mit Glasfläschchen zu 20 und 50 Kapseln, Bündelpackung zu 4 x 50 Kapseln.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Germania Pharmazeutika GmbH, Schuselkagasse 8, 1150 Wien.

#### **Hersteller**

Biose Industrie, 15004 Aurillac, Frankreich.

**Z.Nr.:** 1-23448

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2016.**